

pjprada.com

Adenocarcinoma de próstata bilateral en paciente con derivación uretral a periné por estenosis infranqueable, tratado con braquiterapia de baja tasa de dosis (LDR)

NOTA IMPORTANTE.

Las imágenes incluidas en este documento son contenido sensible de intervenciones quirúrgicas.


ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATA CON AFECTACIÓN BILATERAL EN UN PACIENTE CON DERIVACIÓN DE URETRA A PERINÉ POR ESTENOSIS URETRAL INFRANCREABLE, TRATADA CON BRAQUITERAPIA DE BAJA TASA DE DOSIS (LDR)

Oviedo 30 de Julio de 2026


Con fecha 24/07/2026 he realizado una intervención con braquiterapia de baja tasa de dosis (LDR), por adenocarcinoma de próstata bilateral en un paciente con derivación uretral al periné por estenosis uretral infranqueable a pesar de múltiples intervenciones. Volumen prostático 44 cc.. El tratamiento tiene intención curativa radical y se ha realizado de forma ambulatoria. Durante la evolución no se han presentado efectos secundarios destacables. El paciente presenta una micción normal sin cuadros de retención.

Referencia en pjprada.com

<https://actividades/intervenciones/braquiterapia-ldr-derivacion-uretral-perine-20260724>



Inicio de intervención



Final de intervención